

برگزاری آموزش همگانی ایکتر یا زردی نوزاد



به گزارش واحد بهبود کیفیت، به منظور افزایش آگاهی عموم و ارتقا سلامت جامعه، در تاریخ 14 اسفند 96 جلسه یآموزش همگانی آشنایی با ایکتر یا زردی نوزاد در محل سالن انتظار درمانگاه تخصصی برگزار گردید.

به گزارش واحد بهبود کیفیت، به منظور افزایش آگاهی عموم و ارتقا سلامت جامعه، در تاریخ 14 اسفند 96 جلسه یآموزش همگانی آشنایی با ایکتر یا زردی نوزاد در محل سالن انتظار درمانگاه تخصصی برگزار گردید.

1-زردی فیزیولوژیک نوزادان: این زردی بعد از 24 ساعت اول تولد بروز می کند و بعد از گذشت 7 تا 10 روز از بین می رود و سرعت بروز آن کمتر است.

2-زردی ناشی از شیر مادر: زردی ناشی از شیر مادر تقریباً در 20 درصد نوزادان رسیده که از شیر مادر تغذیه می کنند دیده می شود این نوع زردی پس از روز هفتم شروع می شود و برای 3 تا 10 هفته طول می کشد.

کلیه نوزادانی که دچار زردی می شوند حتی اگر حال عمومی کاملاً خوبی داشته باشند لازم است در اولین فرصت توسط پزشک معاینه شوند. در صورت بروز زردی، مادر شیر خود را به دفعات بیشتری به نوزاد داده و از دادن آب قند و هر گونه داروی محلی به نوزاد خودداری نمایند.

مدفوع و ادرار بچه های مبتلا به زردی با بچه های دیگر هیچ فرقی ندارد و نمی توان تشخیص از روی ادرار یا مدفوع را ملاک قرارداد و **آزمایش خون** بهترین راه است.

از عوارض درمان نشدن زردی می توان به **فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، حملات صرعی، اشکال در تعادل حرکتی، ناهنجاریهای دندانی و ناشنوایی** اشاره کرد که دیگر قابل درمان نیستند پس با مشاهده نخستین نشانه های زردی در کودکان بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

در مورد نوزادانی که از نور فتوتراپی در منزل استفاده می کنند توجهات پرستاری لازم در منزل داده شد.