

آموزش های لازم به بیمار

- داروها را طبق دستور پزشک معالج مصرف کنید.
- قرص های جویدنی را کاملاً بجوید.
- قبل از مصرف شربت های آنتی اسید ، آنها را به خوبی تکان دهید.
- از سرفه کردن عطسه کردن ، و فشار در حین دفع مدفوع و استفراغ پرهیز کنید.
- از مصرف داروهایی مثل آسپرین و داروهای ضد التهاب استروئیدی (ایبوپروفن ، ناپروکسن ، دیکلوفناک پیروکسیکام و مفنامیک اسید) پرهیز کنید.
- از انجام فعالیتهای سنگین و قدرتی تا زمانی که کم خونی شما جبران نشده است خودداری کنید.




رژیم غذایی:

- بیمارانی که از زخم معده شاکی می باشند باید از مصرف غذاهای آماه (فست فود) اجتناب کنند.
- مصرف میان وعده های ناسالم همچون چیپس و پفک و غذاهای تند ، شور، و پر ادویه را به حداقل برسانید.
- از مصرف چایی فراوان و پررنگ پرهیزید و غذاهای چرب نخورید.
- سعی کنید مقدار وعده های غذایی را افزایش اما حجم آنها را کاهش دهید.
- از خوردن سس ، گوجه فرنگی و ترشی اجتناب کنید.
- عدم مصرف سیگار ، و ترک الکل از مواردی است که قابل توجه می باشد.
- از مصرف نوشابه های گاز دار ، شکلات و تنقلات و غذاهای چاشنی دار اجتناب کنید.
- در بیمارانی که علایم برگشت اسید معده به مری دارند، لازم است از دراز کشیدن بلافاصله پس از غذا خودداری کرده و حداقل امکان بالا تنه را در هنگام خواب در موقعیت بالاتری از پایین تنه قرار دهند یا طرف پایین تخت ایشان در سطح پایین تری نسبت به قسمت بالای تخت (از سطح افق) قرار داشته باشد.
- به یاد داشته باشید هر زمان برای سایر مشکلات به پزشک مراجعه کردید سابقه خونریزی گوارشی خود را بیان کنید.



راهنمای خودمراقبتی خونریزی گوارشی (GIB)



کد محتوا: ۳۳
تهیه و تنظیم :
کارگروه آموزش به بیمار
بازنگری ۱۴۰۳

شماره تلفن بیمارستان: ۳۷۲۲۳۰۵۶
داخلی واحد آموزش: ۲۰۳

<https://beheshtih.mrgums.ac.ir>

خونریزی گوارشی چیست؟

خونریزی گوارشی در اثر صدمه و آسیب موضعی ایجاد می شود و موجب زخم مخاط دستگاه گوارش می گردد. که این زخم به شبکه عروقی پیشرفت کرده و همچنین ممکن است حاد یا مزمن باشد.

خونریزی های گوارشی به دو دسته با منشأ **فوقانی و تحتانی** تقسیم می شوند.

علل شایع خونریزی گوارشی :

- زخم های معده و دوازده
- واریسهای گوارشی
- آسیب های مخاط معده و اثنی عشر
- بیماریهای التهابی مری، بدخیمی ها
- سوء مصرف آسپرین و داروهای ضد التهاب
- غیر استروئیدی (ایبوپروفن ، ناپروکسن ، دیکلوفناک ، پیروکسیکام ، ایندومتاسین، مفنامیک اسید ، سیلوکسیب و نیکوتین)
- ناهنجاری های خونی
- تروما و ضربه
- عفونت هیلکوباکتر پیلوری

علائم خونریزی گوارشی

■ استفراغ خون روشن با موادی با زمینه قهوه ای که نشانه خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش است.

■ مدفوع قیری و بدبو ، این نوع مدفوع که ملنا نام دارد بر وجود خون حداقل به مدت ۱۴ ساعت در دستگاه گوارش دلالت دارد.

■ خون قرمز و روشن در مدفوع که بیشتر مربوط به خونریزی قسمت تحتانی گوارشی است.

■ خونریزی مخفی دستگاه گوارش که در آزمایشات اختصاصی مربوط به مدفوع تشخیص داده می شود که با علائم کاهش وزن و کم خونی مزمن همراه است.

■ درد و حساسیت کرامپ شکمی

■ علائم کم خونی مثل خستگی ، سیاهی چشم ، درد قفسه سینه یا تنگی نفس، افت فشار خون و تعریق ، نبض تند، سبکی در سر

■ در برخی موارد شک به دلیل از دست دادن شدید خون (بیش از یک لیتر خون در ۲۴ ساعت)



درمان :

❖ زمانی که بیمار با خونریزی گوارشی مراجعه می کند . پس از متعادل کردن علائم حیاتی بیمار از طریق مایع درمانی مناسب (سرم تزریقی) برای بیمار لوله گذاشته شده ، شستشو معده انجام می شود و وضعیت شدت خونریزی بیمار تخمین زده می شود.

❖ گاه به دلیل عدم توقف خونریزی جراحی اورژانسی ضروری است . برای تشخیص یا درمان خونریزی ، بسته به منشاء آن آندوسکوپی یا کلونوسکوپی انجام می شود.

