



- ❖ فرو رفتن سر سوزن یا اشیاء برنده آلوده در بدن کارکنان بهداشتی درمانی
- ❖ پاشیده شدن خون و یا سایر ترشحات آلوده بدن بیمار به :
- ملتحمه (چشم ها) - بریدگی های باز - غشاء مخاطی (برای مثال داخل دهان)
- ❖ گازگرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود.

در موارد زیر احتمال نیدل استیک شدن بالاتر می باشد :

- در زمان درپوش گذاری مجدد سرسوزن
- طی تمیز کردن و انتقال زباله
- زمانی که سرسوزن در البسه یا ملحفه بیماران جا گذاشته می شود.
- طی جراحی بخصوص زمان بستن زخم
- در بخش های تصادفات و اورژانس
- در زمان انجام تزریقات متعدد و پیچیده

همکار گرامی جهت پیشگیری از مواجهات شغلی رعایت چند نکته توصیه می شود :

- ✓ توصیه می شود اشیاء نوک تیز و برنده (سرسوزن ، سوزن آنژیوکت ، اسکالپ وین ، تیغ بیستوری ، پوکه شکسته آمپول ، شیشه های شکسته ، سوزن بخیه ، سوزن راشی و) پس از استفاده سریعاً در ظروف مخصوص **سفتی باکس** انداخته شوند.
- ✓ پس از تزریق از درپوش گذاری مجدد **تاکیداً خودداری کنید.**
- ✓ در موارد ضروری جهت گذاشتن درپوش سرسوزن از یک وسیله کمکی مانند فورسپس جهت ثابت نگه داشتن درپوش استفاده نمایید یا با **روش یک دستی (scoop)** انجام دهید.
- ✓ جهت حمل اشیاء نوک تیز و سوزن ها از رسیور استفاده کرده و از دست به دست کردن اشیاء نوک تیز یا خم کردن و شکستن سر سوزن ها **اکیداً خودداری نمایید.**

واحد کنترل عفونت

بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه